

***Ferrum metallicum* no tratamento de hemorragia pós penectomia**

Ferrum metallicum in post-penectomy bleeding

Luciana Cristina Padilha¹; Paula Andressa Pennacchi Savi²; Mirian Nagai Bembem³

Animal, canino, Pit Bull, 8 anos, foi levado ao Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel”, na UNESP, campus de Jaboticabal, apresentando nódulo ulcerado, com secreção sanguinolenta, em prepúcio havia dois meses. Iniciou-se tratamento clínico com meloxicam 0,1mg/kg, a cada 24 horas, ranitidina 2mg/kg e enrofloxacin 5mg/kg a cada 12 horas e aplicação local de pomada Vetaglos®, durante 15 dias. Após sete dias, ao retornar, o paciente apresentava o mesmo quadro clínico, e ainda apresentava apetite caprichoso com vômitos esporádicos. Optou-se então por tratamento com doxirrubicina 7mg/kg e ranitidina 2mg/kg, durante 21 dias. Após este período, ainda não havendo melhora, foi indicada a cirurgia de penectomia. Esta foi realizada, sem complicações durante o transoperatório. Este hospital atualmente não possui plantão 24 horas, impossibilitando a internação de animais. Assim, o paciente foi encaminhado para uma clínica particular para maiores cuidados. Dez dias após a cirurgia, o animal retornou ao hospital para reavaliação, quando foi observado grande hemorragia pela ferida cirúrgica. No hemograma foi constatado anemia. Conduta homeopática: Utilizando a hemorragia, abundante, com sangue vermelho vivo como sintomas homeopáticos elegeu-se *Ferrum metallicum* como medicamento de escolha. Um *plus* foi realizado, onde 10 gotas do medicamento homeopático foi adicionado a 200ml de água potável. Nas primeiras duas horas foi administrado ao animal por via oral 3ml a cada 15 minutos, após este período 3ml a cada meia hora. A hemorragia foi contida totalmente após 5 horas do início do tratamento com *plus* de *Ferr*, não sendo realizado nenhum outro tipo de tratamento em conjunto. O animal teve alta recebendo cinco gotas a cada doze horas, durante uma semana. 1º retorno homeopático: animal em excelente condição geral, ferida cirúrgica em ótimo estado de cicatrização, não apresentou mais sangramentos, o remédio homeopático foi ainda administrado por mais duas semanas onde na primeira recebeu cinco gotas a cada 24 horas e na segunda 5 gotas a cada 48 horas.

¹UNESO, Jaboticabal, SP; ²UNESP, Jaboticabal, SP; ³CEHL, Londrina, PR, Brasil.