

Avaliação do medicamento homeopático no tratamento da reabsorção radicular severa: relato de caso

Evaluation of homeopathic treatment in severe radicular reabsorption: case-report

Mario Sergio Giorgi

O tratamento ortodôntico tem por finalidade proporcionar normalidade à oclusão, promovendo equilíbrio funcional do sistema estomatognático, bem como melhora da estética facial e estabilidade dentária na correção da maloclusão. As reabsorções radiculares por terapia ortodôntica são causadas por vários fatores, dentre eles a suscetibilidade individual que cada indivíduo apresenta. Dependendo de sua suscetibilidade, podem apresentar graus de reabsorções diferentes. Relataremos o caso de uma paciente de gênero feminino, que apresenta reabsorções radiculares severas provocadas por tratamento ortodôntico realizado a aproximadamente 5 anos nos elementos dentais 12 11 21 e 22. A paciente relutou em aceitar a necessidade da remoção de tais elementos e optou pelo tratamento homeopático, sendo medicada com o medicamento *simillimum Aconitum napellus*. Paciente M.C.A, leucoderma, gênero feminino, 53 anos, procurou a clínica odontológica da Universidade Bandeirante de São Paulo para reabilitação protética. Como característica da paciente, destacou-se a vaidade e a importância da estética para o desenvolvimento de suas atividades. Apresenta boa higiene oral e doença periodontal controlada. Ao exame radiográfico, foi constatado reabsorção dentária extrema envolvendo incisivos centrais e laterais superiores (12,11,21 e 22) e áreas de reabsorções ósseas provocadas por doença periodontal. A paciente relutou em aceitar a necessidade da remoção de tais elementos e optou pelo tratamento homeopático, sendo submetida a uma consulta, repertorização e o prescrição do medicamento *simillimum Aconitum napellus* na forma líquida e diluição 12cH uma vez ao dia, por 30 dias. Nos primeiros 2 meses, já pudemos notar mudanças de comportamento e aceitação ao tratamento proposto, viabilizando o plano de tratamento. Com seis meses de tratamento, notamos estabilização da reabsorção radicular. O caso tem seguimento de dezoito meses sendo medicada com o mesmo medicamento nas diluições 12cH, 18cH e 30cH, a paciente apresenta equilíbrio emocional, colaborando com a execução do planejamento odontológico proposto, sendo observado pelo exame radiográfico a estabilização do processo de reabsorção.